



Instruccions per a recollida de mostra

Recollida per a l'estudi de l'orina àcida de 24 hores


Aquestes instruccions s'han de seguir per a les determinacions d'àcid vanilmandèlic, àcid homovanílic i àcid 5-hidroxiindolacètic.

És aconsellable evitar els següents aliments i fàrmacs els 3 o 4 dies previs a la recollida de la mostra:

Aliments:	Fàrmacs:
<ul style="list-style-type: none">▪ Plàtan, pinya, kiwi, pruna i tomàquets▪ Fruita seca (nous, avellanes, etc.)▪ Cafè, Coca-Cola i te▪ Xocolata i derivats▪ Vainilla	<ul style="list-style-type: none">▪ Inhibidors de la monoaminoxidasa▪ Inhibidors dels recaptadors de serotonina i noradrenalina▪ Inhibidors dels receptors antagonistes de la serotonina.▪ Simpaticomimètics▪ BloCADORS adrenèrgics▪ Antidepressius

Instruccions per a la recollida de 24 hores

- Durant el període de recollida, no begui més líquids dels habituals ni prengui cap beguda alcohòlica.
- El dia de recollida de l'orina, quan es llevi al matí, orini al vàter per buidar la bufeta.
- A partir d'aquesta hora recollirà tota l'orina de les 24 hores següents, és a dir, fins al matí de l'endemà, quan recollirà la primera orina del dia.
- Durant la recollida d'orina convé mantenir el recipient refrigerat, ben tancat i protegit de la llum durant les 24 hores.
- Si durant aquest període ha d'anar de ventre, intenti orinar abans al contenidor.
- El dia de l'anàlisi haurà de portar al centre d'extracció tota l'orina recollida. Mantingui el contenidor tancat i allunyat de les persones alienes a la recollida.



Més informació

Si té algun dubte o problema, consulti amb nosaltres al telèfon 937 417 700, ext. 2220 o 2210, de 8.00 a 14.30 hores.



Instrucciones para recogida de muestra

Recogida para el estudio de la orina ácida de 24 horas


Estas instrucciones deben seguirse para las determinaciones de ácido vanilmandélico, ácido homovanílico i ácido 5-hidroxiindolacético.

Se aconseja evitar los siguientes alimentos y fármacos en los 3 o 4 días previos a la recogida de la muestra.

Alimentos:	Fármacos:
<ul style="list-style-type: none">▪ Plátano, piña, kiwi, ciruela y tomates▪ Frutos secos (nueces, avellanas, etc.)▪ Café, Coca-Cola y té▪ Chocolate y derivados▪ Vainilla	<ul style="list-style-type: none">▪ Inhibidores de la monoaminoxidasa▪ Inhibidores de los recaptadores de serotonina y noradrenalina▪ Inhibidores de los receptores antagonistas de la serotonina▪ Simpaticomiméticos▪ Bloqueantes adrenérgicos▪ Antidepresivos

Instrucciones para la recogida de 24 horas

- Durante el periodo de recogida, no beba más líquidos de los habituales ni tome ninguna bebida alcohólica.
- El día de recogida de la orina, cuando se levante por la mañana, orine en el inodoro para vaciar la vejiga.
- A partir de esa hora recogerá toda la orina de las siguientes 24 horas, es decir, hasta la mañana del día siguiente, cuando recogerá la primera orina del día.
- Durante la recogida de orina conviene mantener el recipiente refrigerado, bien cerrado y protegido de la luz durante las 24 horas.
- Si durante este periodo tiene que ir de vientre, intente orinar antes en el contenedor.
- El día del análisis deberá traer al centro de extracción toda la orina recogida. Mantenga el contenedor cerrado y alejado de las personas ajenas a la recogida.



Más información

Si tiene alguna duda o problema, consulte con nosotros en el teléfono 937 417 700, ext. 2220 o 2210, de 8.00 a 14.30 horas.