



Recollida de paràsits en femta


Contenedor

Ha de dipositar la femta dins dels contenidors proporcionats pel centre.

Dieta

- Des de 3 dies abans de començar a recollir la femta i mentre duri la recollida de mostres:
- No pot prendre:
 - No pot prendre: llegums, col, aliments amb alt contingut en fibra, tomàquets, albercocs, préssecs, maduixes, figues, peres o qualsevol fruita amb moltes llavors petites i dures.
 - No pot prendre medicaments (antiparàsits, antibiòtics, antidiarreics (grassos), laxants ni purgants, supositoris, olis minerals, bismut, magnesi, preparacions radiològiques de bari, etc.).

Recollida de la mostra



- Reculli la femta de 3 dies consecutius (per exemple: dilluns, dimarts i dimecres). Disposa de 3 envasos diferents, un per a cada dia.
- Renti's les mans amb aigua i sabó abans i després de recollir la mostra.
- Reculli la femta en un recipient net i sec (orinal normal, orinal pla o similar).
- Descargoli el tap de l'envàs que conté líquid a l'interior.
- Amb l'espàtula que porta incorporat el tubet cònic, prengui una petita mostra de femta (de la grandària d'un pèsol). Eviti la contaminació de la mostra amb aigua, orina o paper higiènic.
- Introdueixi l'espàtula amb la mostra a l'interior del tub que conté líquid.
- Tapi el flascó ben fort i agiti'l suaument perquè la femta i el líquid es barregin bé, sense invertir-lo.
- Anoti la data de la presa de la mostra.
- Guardi el flascó a temperatura ambient fins que el porti al laboratori, amb l'extrem cònic cap amunt.
- Repeteixi l'operació en dies consecutius. Ha de ser femta fresca recollida poques hores després de l'excreció.
- No acceptarem flascons embrutats per fora ni amb més quantitat de femta que la indicada.

Més informació

Si té algun dubte o problema, consulti amb nosaltres al telèfon 937 417 700, ext. 2220 o 2210, de 8.00 a 14.30 hores.



Recogida de parásitos en heces

Contenedor

Deberá depositar las heces en los contenedores proporcionados por el centro.

Dieta

- Desde 3 días antes de empezar a recoger las heces y mientras dure la recogida de muestras:
- No puede tomar:
 - Legumbres, col, alimentos con alto contenido de fibra, tomates, albaricoques, melocotones, fresas, higos, peras o cualquier fruta con muchos granos pequeños y duros.
 - Medicamentos (antiparásitos, antibióticos, antidiarreicos (grasos), laxantes ni purgantes, supositorios, aceites minerales, bismuto, magnesio, papillas radiológicas de bario, etc.).

Recogida de la muestra



- Recoja las heces de 3 días consecutivos (por ejemplo: lunes, martes y miércoles). Dispone de 3 envases diferentes, uno para cada día.
- Lávese las manos con agua y jabón, antes y después de recoger la muestra.
- Recoja las heces en un recipiente limpio y seco (cuña, orinal o similar).
- Desenrosque el tapón del envase que contiene líquido en su interior.
- Con la espátula que lleva incorporado el tubito cónico, tome una pequeña muestra de heces (del tamaño de un guisante). Evite la contaminación de la muestra con agua, orina o papel higiénico.
- Introduzca la espátula con la muestra en el interior del tubo que contiene líquido.
- Tape el frasco con fuerza y agite suavemente para que se mezclen bien, sin invertirlo.
- Anote la fecha de la toma de la muestra.
- Guarde el frasco a temperatura ambiente hasta llevarlo al laboratorio, con el extremo cónico hacia arriba.
- Repita la operación en días consecutivos. Deben ser heces frescas recogidas pocas horas después de la excreción.
- No se aceptarán frascos ensuciados por fuera ni con mayor cantidad de heces que la indicada.

Más información

Si tiene alguna duda o problema, consulte con nosotros en el teléfono 937 417 700, ext. 2220 o 2210, de 8.00 a 14.30 horas.