



Angiografia oftalmològica

Introducció

És una prova que permet detectar lesions de la retina que no es poden visualitzar amb una oftalmoscòpia simple.

El dia de la prova

- Presenti's a la **planta baixa, despatx 22**, a l'hora programada.
- Ha de venir acompanyat/ada i amb ulleres de sol.
- No cal que estigui en dejú.
- Pot prendre la medicació habitual.
- Si el metge/la metgessa li ha receptat unes gotes per dilatar els ulls, comenci a posar-se-les una hora i mitja abans de la prova.
- Abans de començar la prova, el metge/la metgessa li explicarà en què consisteix la prova i haurà de signar el document de consentiment informat.
- Si té al·lèrgia a algun medicament (especialment al contrast iodat), ens n'haurà d'informar.

Com es fa la prova

- Durant la prova estarà acompanyat/ada per professionals sanitaris.
- Abans de començar la prova, li col·locaran un catèter al braç o a la mà.
- La prova té una durada aproximada de 15 minuts.
- Comprovaran que els dos ulls estiguin dilatats. Si no és així, a la mateixa sala d'espera li instil·laran les gotes necessàries.
- La prova consisteix a fotografiar els dos ulls, per a la qual cosa li injectaran una substància que actua de contrast (fluorosceïna sòdica) a través del catèter. Aquesta substància no causa dolor i, a vegades, produeix una sensació de nàusea que passa de seguida.
- Un cop acabada la prova, li retiraran el catèter.

Després de la prova

- Tornarà al seu domicili.
- Com que els ulls estaran dilatats, hi veurà borrós durant unes hores i la llum li resultarà molesta. Després podrà fer vida normal.
- Fins a l'eliminació del contrast, l'orina, la pell i les mucoses tindran una coloració groguenca (unes 24 hores).

Més informació

- Si té algun dubte o problema, consulti amb nosaltres al telèfon **937 417 700, extensió 1954**, de **dilluns a divendres, de 8.00 a 14.30 hores**.



Angiografía oftalmológica

Introducción

Es una prueba que permite detectar lesiones en la retina que no pueden visualizarse con una oftalmoscopia simple.

El día de la prueba

- Preséntese en la **planta baja, despacho 22**, a la hora programada.
- Venga acompañado/a y traiga unas gafas de sol.
- No es necesario que venga en ayunas.
- Puede tomar su medicación habitual.
- Si el/la médico/a le ha recetado unas gotas para dilatar los ojos, empiece a ponérselas una hora y media antes de la prueba.
- Antes de iniciar la prueba, el/la médico/a le explicará en qué consiste y tendrá que firmar el documento de consentimiento informado.
- Si tiene alergia a algún medicamento (especialmente al contraste yodado), deberá informarnos de ello.

Cómo se efectúa la prueba

- Durante la prueba estará acompañado/a por profesionales sanitarios.
- Antes de empezar la prueba, le colocarán un catéter en el brazo o en la mano.
- La prueba tiene una duración aproximada de 15 minutos.
- Comprobarán que los dos ojos estén dilatados. De no ser así, en la misma sala de espera le instilarán las gotas necesarias.
- La prueba consiste en fotografiar los dos ojos. Con esta finalidad, le inyectarán una sustancia que actúa de contraste (fluoroscéina sódica) a través del catéter. Esta sustancia no causa dolor y a veces puede producir una sensación de náusea que se le pasará en seguida.
- Una vez finalizada la prueba le retirarán el catéter.

Después de la prueba

- Volverá a su domicilio.
- Como los ojos estarán dilatados, verá borroso durante unas horas y le molestará la luz. Después podrá realizar vida normal.
- Hasta la eliminación del contraste, la orina, la piel y las mucosas tendrán una coloración amarillenta (unas 24 horas).

Más información

- Si tiene alguna duda o problema, consulte con nosotros en el teléfono **937 417 700**, extensión **1954**, de **lunes a viernes**, de **8.00 a 14.30 horas**.