



Prick test o cutireaccions

Introducció

És una prova diagnòstica que mesura la reacció cutània al·lèrgica davant de substàncies inhalades.

Abans de la prova

Deixi de prendre la medicació antihistamínica 10 dies abans de la prova.

El dia de la prova

- Adreci's a la consulta que li aparegui indicada al gestor de cues quan validi la seva visita.
- No ha d'estar en dejuni ni necessita cap preparació.
- No cal que l'acompanyin.
- Li posarem una sèrie de gotes d'al·lèrgens sobre la pell de l'avantbraç i seguidament practicarem una erosió perquè el líquid penetri.
- Haurà d'esperar 10 minuts perquè puguem valorar la reacció al·lèrgica cutània (pàpula).

Després de la prova

Controli que la pàpula desaparegui en unes 2 hores, si no és així ha d'acudir a Urgències.

Més informació

Si té algun dubte o problema, consulti amb nosaltres al telèfon 937 417 700, ext. 2721, de 8 a 15 hores



Prick test o cutirreacciones

Introducción

Es una prueba diagnóstica que mide la reacción cutánea alérgica ante sustancias inhaladas.

Antes de la prueba

Deje de tomar la medicación antihistamínica 10 días antes de la prueba.

El día de la prueba

- Diríjase a la consulta que le aparezca indicada en el gestor de colas en el momento que valide su visita.
- No ha de estar en ayunas ni necesita ninguna preparación.
- No es necesario que esté acompañado/a.
- Le pondremos una serie de alérgenos encima de la piel del antebrazo y seguidamente practicaremos una erosión para que el líquido penetre.
- Tendrá que esperar 10 minutos para que podamos valorar la reacción alérgica cutánea (pápula).

Después de la prueba

Controle que la pápula desaparezca en unas 2 horas. De no ser así, acuda a Urgencias.

Más información

Si tiene alguna duda o problema, consulte con nosotros en el teléfono 937 417 700, ext. 2721, de 8 a 15 horas