

TAC colonoscòpia virtual

La colonoscòpia virtual és una exploració de l'intestí gros (còlon) mitjançant raigs X. L'exploració consisteix en la insuflació d'aire a través del recte, prèvia col·locació d'una sonda de goma.

Medicació que heu de suspendre

▪ 5 dies abans de la prova:

- Heu de deixar de prendre medicaments amb ferro i fibra com Plantaben o Plantago Ovata.
- Consulteu el vostre metge/la vostra metgessa si heu de deixar de prendre antiagregants, com ara Clopidogrel, Plavix, Tiklid, etc.
- Podeu continuar prenent AAS, Adiro, Tromalyt 150 mg, etc.

Preparació

- **3 dies abans de la prova:** heu de seguir una **dieta tova**: consumés suaus, sopes, cremes, purés, sèmola d'arròs, minestra, arròs blanc, pit de pollastre, gall d'indi, vedella o peix a la planxa o bullit, pernil dolç, truita a la francesa, pomes, iogurt, codonyat, plàtan, suc de fruites.


És imprescindible una correcta preparació per assegurar l'eficàcia de la prova i evitar repeticions innecessàries.

La nit prèvia a la prova (a les 21.00 h)	A les 5.00 h del matí, el dia de la prova
Heu de prendre la primera dosi de Pleinvue : dissolgueu el sobre en mig litre d'aigua i us el beveu en mitja hora. Posteriorment, heu de beure mig litre més de líquid sense gas (aigua, suc colat, infusió o beguda isotònica). No begueu llet.	Heu de prendre la segona dosi de Pleinvue (sobre A + sobre B) : dissolgueu els dos sobres en mig litre d'aigua i el repartiu en 4 gots de 125 ml. Després, prepareu mig litre de líquid sense gas i el repartiu en 4 gots de 125 ml. Begueu un got del preparat alternant amb un got de líquid sense gas cada 15-20 minuts, fins a completar els 8 gots.

Preparació de Pleinvue

	Primera dosi de Pleinvue Dissolgueu el sobre en mig litre d'aigua i us el beveu en mitja hora. Posteriorment, heu de beure mig litre més de líquid sense gas.
---	--



	Segona dosi de Pleinvue Dissolgueu el sobre A i el sobre B en mig litre d'aigua i el repartiu en 4 gots de 125 ml. Després, prepareu mig litre de líquid sense gas i el repartiu en 4 gots de 125 ml. Begueu un got del preparat alternant amb un got de líquid sense gas cada 15-20 minuts, fins a completar els 8 gots.
---	--

IMPORTANT: no podeu beure res a partir de 2 hores abans de la prova.

El dia de la prova

Heu de venir en dejú. Només heu d'haver pres el preparat Pleinvue.

No porteu objectes de valor (rellotges, arracades, cadenes, anells, etc.), ja que us els haureu de treure.

Porteu **roba còmoda**.

Més informació

- El dia de la prova **valideu la vostra visita**, amb la **targeta sanitària**, a les màquines dispensadores de tiquets situades a l'entrada de l'Hospital i adreceu-vos a la sala d'espera que hi consti.
- Si necessiteu **modificar o anul·lar la cita programada** contacteu amb nosaltres:
 - **Omplint el formulari de la web csdm.cat:** [Consultes o canvis de visites per servei | Consorci Sanitari del Maresme](#)
 - **Per telèfon:**
 - Directament al servei, en dies laborables de 12 h a 15 h, al telèfon 937 417 700, extensió 2089 o 2084.
 - Resta de l'horari, en dies laborables de 8 h a 20 h, al telèfon 937 417 769.
 - **Presencialment:** al taulell de Consultes Externes de la planta 0 de l'Hospital de Mataró, en dies laborables de 8 a 20 h.
- Si teniu algun **dubte o problema sobre la preparació de la prova**, consulteu amb nosaltres, **en dies laborables de 8 a 20 h, al telèfon 937 417 764**.

TAC colonoscopia virtual

La colonoscopia virtual es una exploración del intestino grueso (colon) mediante rayos x. La exploración consiste en la insuflación de aire a través del recto, previa colocación de una sonda de goma.

Medicación que ha de suspender

5 días antes de la prueba:

- Debe dejar de tomar medicamentos con hierro y fibra, como Plantaben o Plantago Ovata.
- Consulte a su médico/a si debe dejar de tomar antiagregantes, como Clopidogrel, Plavix, Tiklid, etc.
- Puede continuar tomando AAS, Adiro, Tromalyt 150 mg, etc.

Preparación

- **3 días antes de la prueba:** debe seguir una **dieta blanda:** consomés suaves, sopas, cremas, purés, sémola de arroz, menestra, arroz blanco, pechuga de pollo, pavo, ternera o pescado a la plancha o hervido, jamón cocido, tortilla a la francesa, manzanas, yogurt, membrillo, plátano, zumo de frutas.


Es imprescindible una correcta preparación para asegurar la eficacia de la prueba y evitar repeticiones innecesarias.

La noche previa a la prueba (a las 21.00 h)	A las 5.00 h de la mañana, el día de la prueba
Ha de tomar la primera dosis de Pleinvue : disuelva el sobre en medio litro de agua y bébaselo en media hora. Posteriormente, ha de beber medio litro más de líquido sin gas (agua, zumo colado, infusión o bebida isotónica). No beba leche.	Ha de tomar la segunda dosis de Pleinvue (sobre A + sobre B) : disuelva los dos sobres en medio litro de agua y repártalo en 4 vasos de 125 ml. Después, prepare medio litro de líquido sin gas y repártalo en 4 vasos de 125 ml. Beba un vaso del preparado alternando con un vaso de líquido sin gas cada 15-20 minutos, hasta completar los 8 vasos.

Preparación de Pleinvue

	Primera dosis de Pleinvue Disuelva el sobre en medio litro de agua y bébaselo en media hora. Posteriormente, ha de beber medio litro más de líquido sin gas.
---	---



	Segunda dosis de Pleinvue Disuelva el sobre A y el sobre B en medio litro de agua y repártalo en 4 vasos de 125 ml. Después, prepare medio litro de líquido sin gas y repártalo en 4 vasos de 125 ml. Beba un vaso del preparado alternando con un vaso de líquido sin gas cada 15-20 minutos, hasta completar los 8 vasos.
---	--

IMPORTANTE: no puede beber nada a partir de 2 horas antes de la prueba.

El día de la prueba

Ha de venir en ayunas. Sólo debe haber tomado el preparado Pleinvue.

No lleve objetos de valor (relojes, pendientes, cadenas, anillos, etc.), ya que se los deberá quitar.

Lleve **ropa cómoda**.

Más información

- El día de la prueba **valide su visita**, con la **tarjeta sanitaria**, en las máquinas dispensadoras de tickets situadas en la entrada del Hospital y diríjase a la sala de espera que conste en el ticket.
- Si necesita **cambiar o anular la cita programada**, contacte con nosotros:
 - Rellenando el formulario de la web csdm.cat:** [Consultas o cambios de visitas por servicio | Consorcio Sanitario del Maresme](#)
 - Por teléfono:**
 - Directamente con el servicio, en días laborables de 12 a 15 h, en el teléfono 937 417 700, extensión 2089 o 2084.
 - Resto del horario, en días laborables de 8 a 20 h, en el teléfono 937 417 769.
 - Presencialmente:** en el mostrador de Consultas Externas de la planta 0 del Hospital de Mataró, en días laborables de 8 a 20 h.
- Si tiene alguna **duda o problema sobre la preparación de la prueba**, consulte con nosotros, **en días laborables de 8 a 20 h, en el teléfono 937 417 764**.