

Circuit diagnòstic:

Metge d'atenció primària



1-2 setmanes

Pneumologia



2 setmanes

TC tòrax, analítica +/- fibrobroncoscòpia



2 setmanes




Diagnòstic

Comité Multidisciplinar
H. Germans Trias i Pujol


EPIMAR

dEtecció Precoç
de malaltia pulmonar
Intersticial al **MAResme**



MPID:

- Les malalties pulmonars intersticials difuses (MPID), amb la fibrosi pulmonar idiopàtica com a màxim representant, són un grup de malalties progressives que afecten al parènquima pulmonar, algunes d'elles amb infaust pronòstic.
- Les MPID poden ser idiopàtiques o secundàries a d'altres processos o malalties: exposició a plomes, fongs d'humitat, malalties autoimmunes principalment, etc.
- Un diagnòstic en fases més inicials pot millorar el pronòstic de la malaltia i donar accés a nous tractaments.



Sospita diagnòstica:

- Dísipnea d'esforç progressiva i/o tos seca
- Crepitants secs 'en velcro' bibasals
- Espirometria restrictiva ($FEV_1/FVC > 0.8$ i $FVC < 80\%$)
- Acropàquies
- Patró intersticial a la Rx tòrax
- Pacients menors de 80 anys i descartada insuficiència cardíaca

Davant d'una sospita diagnòstica realitzar derivació PREFERENT a Pneumologia indicant EPIMAR al motiu de derivació.