



Prova urodinàmica

Introducció

La prova urodinàmica es practica per estudiar el funcionament de la bufeta urinària.

Abans de la prova

- 15 dies abans de la prova s'ha de fer una anàlisi d'orina a l'Hospital de Mataró o al seu centre de referència.
- Procuri defecar abans d'acudir a la prova; si cal es pot posar un supositori de glicerina.

El dia de la prova

- Ha de portar el resultat de l'anàlisi de la mostra d'orina recollida 15 dies abans, en cas que aquesta no s'hagi analitzat a l'Hospital de Mataró.
- Orini per última vegada dues hores abans de la prova.
- Un hora abans de la prova ha d'haver acabat de beure's mig litre d'aigua ja que ha d'arribar a l'Hospital amb moltes ganes d'orinar.
- Sigui puntual.
- No cal que vingui en dejú.
- Si el seu/la seva metge/essa no li indica el contrari, pot prendre la medicació habitual.
- La prova es practicarà a la planta baixa, despatx 10, el dia i l'hora que li han indicat.
- Porti tots els resultats i informes de proves i intervencions quirúrgiques relacionades amb el seu problema urinari a què s'hagi sotmès.

La prova

- Durant la prova estarà acompanyat/ada per personal mèdic i d'infermeria que li proporcionarà la màxima comoditat i intimitat.
- La prova té una durada de 45 a 60 minuts. Mentre es porti a terme li aniran explicant els procediments i li indicaran què ha de fer:
 - Li demanaran que orini en un recipient especial.
 - Li col·locaran una petita sonda per tal de mesurar la pressió de la bufeta.
 - Li col·locaran una sonda a través del recte (com un supositori) per mesurar la pressió de l'abdomen.
- Sentirà alguna molèstia, però la prova no és dolorosa.
- És possible que mentre li fan la prova tingui pèrdua d'orina.
- Recordi que aquesta prova es practica per saber el motiu de la seva incontinència urinària.
- En acabar la prova li retiraran totes les sondes.

Després de la prova

- L'endemà de la prova haurà de continuar el tractament segons la prescripció mèdica.



- És possible que durant unes hores senti alguna molèstia o coïssor en orinar, que hagi d'orinar més sovint o que l'orina sigui de color rosat.
- Aquestes molèsties aniran desapareixent i si fa una ingesta d'aigua abundant afavorirà que disminueixin.

Recordi

- Si té qualsevol dubte o necessita algun aclariment pot trucar al telèfon 937 417 700, ext. **1731**.



Prueba urodinámica

Introducción

La prueba urodinámica se practica para estudiar el funcionamiento de la vejiga urinaria.

Antes de la prueba

- 15 días antes de la prueba tiene que realizarse un análisis de orina en el Hospital de Mataró o en su centro de referencia.
- Procure defecar antes de acudir a la prueba; en caso necesario, puede ponerse un supositorio de glicerina.

El día de la prueba

- Ha de traer el resultado del análisis de la muestra de orina recogida 15 días antes, si la misma no se ha analizado en el Hospital de Mataró.
- Orine por última vez dos horas antes de la prueba.
- Una hora antes de la prueba tiene que haber acabado de beber medio litro de agua, puesto que cuando llegue al Hospital ha de tener muchas ganas de orinar.
- Sea puntual.
- No es necesario que venga en ayunas.
- Si su médico/a no le indica lo contrario, puede tomar la medicación habitual.
- La prueba se practicará en la planta baja, despacho 10, el día y la hora indicados.
- Traiga todos los resultados e informes de pruebas e intervenciones quirúrgicas relacionadas con su problema urinario a las que se haya sometido.

La prueba

- Durante la prueba estará acompañado/a por personal médico y de enfermería que le proporcionará la máxima comodidad e intimidad.
- La prueba tiene una duración de 45 a 60 minutos y durante la misma le irán explicando los procedimientos e indicándole lo que tiene que hacer:
 - Le pedirán que orine en un recipiente especial.
 - Le colocarán una pequeña sonda para medir la presión de la vejiga.
 - Le colocarán una sonda a través del recto (como un supositorio) para medir la presión del abdomen.
- Sentirá alguna molestia, pero la prueba no es dolorosa.
- Es posible que mientras le efectúen la prueba tenga pérdida de orina.
- Recuerde que esta prueba se practica para saber el motivo de su incontinencia urinaria.
- Al finalizar la prueba le retirarán todas las sondas.



Después de la prueba

- El día siguiente a la prueba deberá seguir el tratamiento según la prescripción médica.
- Es posible que durante unas horas sienta alguna molestia o escozor al orinar, que tenga que orinar más a menudo o que la orina sea de color rosado.
- Estas molestias irán desapareciendo y podrá favorecer que disminuyan si bebe agua en abundancia.

Recuerde

- Si tiene alguna duda o necesita alguna aclaración puede llamar al teléfono **937 417 700, ext. 1731.**